



**Δρ. Χρήστος Κ. Γιαννακόπουλος**  
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Πύργος Αθηνών, Κτίριο Γ', 2<sup>ος</sup> όροφος, Λεωφ. Μεσογείων 2-4, Αθήνα 115 27

**Τηλ.:** 210 7712792 | **Κινητό:** 697 20 999 11 | **E-mail:** cky@orthosurgery.gr

## Διακοπή Φαρμάκων Προ της Επέμβασης

Τα παρακάτω φαρμακευτικά σκευάσματα είναι δυνατό να προκαλέσουν προβλήματα κατά την επέμβαση και γι' αυτό το λόγο είναι αναγκαία η προσωρινή διακοπή τους λίγο προ της επέμβασης.

Παρατίθενται γενικές οδηγίες. Για λεπτομερή πληροφόρηση επικοινωνήστε με τον Ιατρό ή τον Αναισθησιολόγο.

- Ασπιρίνη

Διακοπή 1 εβδομάδα προεγχειρητικά

- Αντιπηκτικά όπως Sintrom ή Plavix

Διακοπή τουλάχιστον 1 εβδομ

άδα προ της επέμβασης και πιθανή έναρξη ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους

- Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη

Διακοπή 1 εβδομάδα προεγχειρητικά

- Αντιλιπιδαιμικά φάρμακα

Διακοπή 1 ημέρα προ της επέμβασης και επανέναρξη όταν θα τρώτε ελεύθερα

- Αντισυλληπτικά

Σε ασθενείς με κίνδυνο θρόμβωσης διακοπή τουλάχιστον 4 εβδομάδες προ της επέμβασης και τουλάχιστον κατά την μετεγχειρητική περίοδο

- Υποκατάστατα οιστρογόνων ή Τροποποιητές υποδοχέων οιστρογόνων

Διακοπή τουλάχιστον 4 εβδομάδες προ της επέμβασης

- Αντικαταθλιπτικά, Αναστολείς MAO, Ηρεμιστικά

Συζητήστε το θέμα με τον αναισθησιολόγο